

Timbro della struttura che rilascia la scheda informativa



## CONSENSO PER LA CORREZIONE DEI DIFETTI DI VISTA TRAMITE SMILE

### INDICAZIONI E PROCEDURA

La procedura SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) utilizza un laser a femtosecondi che ritaglia un sottile lenticolo (piccola lente) di tessuto sotto la superficie corneale che viene quindi rimosso attraverso una piccola incisione.

La procedura SMILE è indicata al momento per il trattamento della miopia e può essere utilizzata in pazienti di età superiore ai 22 anni per un trattamento fino a 10,00 Diottrie (D) di correzione per la miopia e per il trattamento dell'astigmatismo fino a 5 diottrie.

### RISCHI E COMPLICAZIONI

Come tutti gli interventi chirurgici, questa procedura presenta alcuni rischi. La maggior parte delle potenziali complicanze ed effetti collaterali elencati nel consenso per la FEMTOLASIK si applicano anche alla SMILE. Oltre a questi rischi, ci sono considerazioni specifiche sulla procedura SMILE.

Per creare con successo il lenticolo con il laser a femtosecondi è necessario mantenere l'aspirazione su ciascun occhio per circa 40 secondi. La maggior parte dei pazienti non sente questa parte della procedura e c'è una luce di fissazione da guardare durante questo periodo. Se un paziente dovesse spremere eccessivamente le palpebre durante questo periodo, c'è la possibilità che l'aspirazione (suzione) possa essere interrotta. Se ciò dovesse accadere entro una parte specifica del trattamento, la procedura dovrebbe essere interrotta senza completamento. Altre volte durante la procedura, la suzione può essere riapplicata e la procedura può essere completata con successo. Se la procedura non viene completata, la vista dovrebbe tornare allo stato pre-chirurgico. Una procedura alternativa come LASIK o PRK può essere eseguita nello stesso giorno o in un altro momento.

Al momento dell'intervento chirurgico, se il chirurgo ritiene che un paziente non sarà in grado di mantenere la suzione durante l'intera procedura, potrebbe scegliere di raccomandare LASIK o PRK anziché SMILE.

Vi è anche una piccola possibilità di altre complicazioni, ad esempio il lenticolo potrebbe essere strappato durante la rimozione, la cornea potrebbe essere perforata o una piccola parte del lenticolo potrebbe essere lasciata all'interno della cornea. Nella maggior parte dei casi, queste problematiche non influiscono sull'esito, ma potrebbe essere necessario eseguire un secondo intervento chirurgico per rimuovere le parti rimanenti del lenticolo o per altri motivi che potrebbero richiedere un successivo trattamento chirurgico.

In caso di risultato incompleto con SMILE può essere necessario un ritocco che può essere effettuato con tecnica Prk o con varianti tecniche della SMILE più simili alla femtolasik.

### DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E COMPrensIONE DEL PAZIENTE

Ho letto il consenso per FEMTOLASIK e ho capito capisco che molti dei rischi associati a questo intervento si applicano anche alla procedura SMILE.

- Sto scegliendo di eseguire SMILE, ma nel caso in cui il mio chirurgo ritenga che non sia sicuro procedere con SMILE, acconsento all'esecuzione della FEMTOLASIK.
- Comprendo che potrei dover tornare per una procedura alternativa in un'altra data.

Mi sono stati presentati i dettagli della procedura nota come SMILE, nonché interventi chirurgici alternativi come la FEMTOLASIK. Il mio oculista e il personale hanno risposto a tutte le mie domande con soddisfazione. Mi è stata offerta una copia di questo modulo di consenso e pertanto acconsento a SMILE su:

Occhio destro \_\_\_\_\_ Occhio sinistro \_\_\_\_\_ Entrambi gli occhi \_\_\_\_\_

Data della firma del paziente

---

Data firma chirurgo

---